

Camisinha e testes rápidos
estão à disposição da população
em todas as unidades básicas de saúde.
Para a localização das unidades
e mais informações sobre PrEP e PEP,
Acesse o QR Code:



@digitalcomunicacao

PREVENÇÃO COMBINADA

te amo

Não deixe o HIV e as ISTs
entrarem na folia



PREVENÇÃO COMBINADA CONTRA O HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS



Camisinha em todas
as relações sexuais



Testes periódicos
para HIV, sífilis
e hepatites B e C



Uso da PrEP
e da PEP



PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV)

Quando usar?

Antes da exposição sexual, sob avaliação do profissional de saúde.

O que é?

Uso diário de medicamentos que reduzem em mais de 92% o risco de infecção por HIV.

Quem deve usar?

Pessoas a partir de 15 anos, não infectadas com HIV, mas com maior chance de entrar em contato com o vírus, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, casais sorodiferentes, gays e a população em geral que se enquadra neste perfil.



PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV)

Quando usar?

Em situações de emergência, até 72 horas após a exposição ao HIV.

O que é?

Uso de medicamentos que reduzem o risco de infecções em situações de exposição ao risco de infecção por HIV.

Quem deve usar?

Pessoas que não tem HIV, mas foram expostas ao vírus por meio de relação sexual desprotegida (sem o uso ou com camisinha rompida); violência sexual; acidentes ocupacionais (com instrumentos perfurocortantes ou contato com material biológico). Também é indicada para prevenir a transmissão do HIV da mãe para o filho.

