

O QUE É A RAIVA?

É uma doença causada por vírus, transmitida somente por mamíferos e geralmente letal.

COMO A RAIVA PODE SER TRANSMITIDA?

Por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura onde ocorre o contato com a saliva de um animal infectado.

Todos os mamíferos podem ser contaminados, mas os principais transmissores ao homem são:

Cães



Gatos



Morcegos



Macacos



O ciclo de transmissão pode ser aéreo (morcegos), silvestre (capivara, mucura, macacos) urbano (cães e gatos) e rural (animais de criação, bovinos, equinos).

COMO SE PREVENIR DO VÍRUS DA RAIVA?

- Evite contato com animais estranhos, feridos ou doentes;
- Não perturbe animais quando eles estiverem comendo, bebendo ou dormindo;
- Nunca separe animais quando eles estiverem brigando;
- Evite entrar em grutas e tocar em qualquer tipo de morcego, vivo ou morto;
- Não crie nem remova os animais silvestres do habitat natural;
- Vacine anualmente os animais domésticos (cães e gatos);
- Não deixe cães e gatos soltos nas ruas;
- Se o animal for mordido, procure imediatamente a assistência veterinária.



Prefeitura de

Manaus

Saúde

Secretaria Municipal

CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES

Av. Brasil, s/n – Compensa

Contato: 3216-8153/3216-2555

Número de telefone para casos de agressão e/ou morte do animal: 0800 280 8280



@semsamanaus

PROGRAMA DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA

RAIVA
MATA



Saúde
Secretaria Municipal



Prefeitura de

Manaus

QUAIS OS SINTOMAS DA RAIVA?

RAIVA HUMANA

- Confusão, desorientação, agressividade, dificuldade de deglutir, paralisia motora (movimentos), espasmos, salivação excessiva;
- Uma vez iniciada a manifestação dos sintomas neurológicos, a pessoa infectada com o vírus morre em 99,9% dos casos.

CACHORROS

- Agressividade;
- Salivação excessiva;
- Fotofobia;
- Tremores musculares e ranger de dentes;
- Falta de coordenação motora;
- Andar cambaleante e contrações involuntárias;
- Latido rouco.

GATOS

- Mudanças sutis de comportamento;
- Salivação excessiva;
- Hiperatividade e possíveis convulsões;
- Estrabismo (olhos vesgos);
- Isolamento;
- Fotofobia (aversão à luz).

A morte ocorre de 5 a 7 dias após o início dos sintomas



QUAIS OS CUIDADOS EM CASO DE AGRESSÃO POR ANIMAL?

- Lavar imediatamente o ferimento com água e sabão;
- Procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde de referência mais próxima;
- Não matar o animal. Deixá-lo em observação durante 10 dias para identificar qualquer sinal indicativo da raiva;
- O animal deverá receber água e alimentação normalmente, num local seguro, para evitar fugas ou agressões a outras pessoas ou animais;
- Se o animal adoecer, morrer, desaparecer ou mudar de comportamento retornar imediatamente à unidade de saúde de referência onde foi atendido;
- Nunca interromper o tratamento preventivo sem ordens da equipe de saúde.

Animais considerados de baixo risco para transmissão da raiva (sem necessidade de tratamento):

- Coelho, rato, porquinho da índia, camundongos, hamster.

Se for agredido por um animal procure a unidade básica de saúde de referência mais próxima.



ATENÇÃO

Quando um animal apresentar comportamento estranho, mesmo que ele não tenha agredido ninguém, não o mate. Procure a Unidade Básica de Saúde de referência e entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (92) 3216-8153/3216-2555

UNIDADES DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO

ZONA	UNIDADE DE SAÚDE
LESTE	USF ALFREDO CAMPOS
	USF LEONOR BRILHANTE
	USF MAUAZINHO
	USF JOSÉ AMAZONAS PALHANO
	USF HOSPITAL CHAPOT PREVOST
OESTE	USF DEODATO DE MIRANDA LEÃO
	USF LINDALVA DAMASCENO
	USF LEONOR DE FREITAS
NORTE	USF ARMANDO MENDES
	USF SÁLVIO BELOTA
	USF ÁUGIAS GADELHA
	USF BALBINA MESTRINHO
	USF JOSÉ FIGLIUOLO
	CLÍNICA DA FAMÍLIA CARMEN NICOLAU
SUL	USF LÚCIO FLÁVIO
	USF PETRÓPOLIS
	USF DR. JOSÉ RAYOL DOS SANTOS
	USF THEOMÁRIO PINTO

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE AO LADO PARA ACESSAR A RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO

