

ESQUEMAS VACINAIS PARA **PROFILAXIA ANTIRRÁBICO HUMANO**

ESQUEMA DE PRÉ-EXPOSIÇÃO

INDICAÇÃO	DIAS PARA APLICAÇÃO	CONTROLE SOROLÓGICO
<ul style="list-style-type: none"> Médicos e estudantes de medicina veterinária e cursos afins que atuam com risco constante de exposição ao vírus rábico; Profissionais que comprovem atividade de campo e/ou atuação em laboratório de raiva. 	Duas doses: 0 - 3	Realizado nos Laboratórios Distritais Sul e Oeste a partir do 14º dia, após receber a última dose do esquema.

ESQUEMA DE REEXPOSIÇÃO

TIPO DE ESQUEMA ANTERIOR	ESQUEMA DE REEXPOSIÇÃO CULTIVO CELULAR		
Pré-exposição (PREP)	Completo ou incompleto	O SAR e a IGHAR estão contraindicados.	
	Completo	Indicada a Profilaxia nos dias 0 e 3 (independentemente do intervalo de tempo)	
	Incompleto	Com apenas 01 dose de PREP - desconsiderar e iniciar o esquema de Profilaxia indicado ao caso.	
Pós-exposição (PEP)	Independente	O SAR e a IGHAR estão contraindicados.	
	Até 90 dias	Completo	Não indicar Profilaxia
		Incompleto	Administrar as doses faltantes
	Após 90 dias	<i>Indicar a vacina nos dias 0 e 3, independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu pelo menos 2 doses do esquema de PEP.</i>	
Obs.: quando na PEP anterior foi aplicada apenas 01 dose, desconsiderar e iniciar o esquema de Profilaxia, indicado para o caso.			

CONDUTA EM CASO DE PACIENTES FALTOSOS E APLICAÇÃO DAS DOSES PARA COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL

DATA DA APLICAÇÃO	DOSES	EM CASO DE FALTA	APLICAÇÃO DAS DOSES PARA COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL		
Dia 0	1ª	No dia que comparecer ao serviço para atendimento			
Dia 3	2ª	Na 2ª dose	No dia que comparecer ao serviço para atendimento	Manter o intervalo do esquema original entre as doses	
Dia 7	3ª	Na 3ª dose			
Dia 14	4ª	Na 4ª dose			7 dias após a 3ª dose