

ESQUEMA DE PROFILAXIA DA
RAIVA HUMANA PÓS-EXPOSIÇÃO



Semsa
Secretaria Municipal



Prefeitura de
Manaus



ESPÉCIE DO ANIMAL AGRESSOR

TIPO DE EXPOSIÇÃO	Cão ou Gato		Mamífero Doméstico de Interesse Econômico: Bovídeos, equídeos, caprinos, suínos e ovinos.	Morcego e outros mamíferos Silvestres: (Inclusive os domiciliados)
	Animal PASSÍVEL DE OBSERVAÇÃO por 10 dias e SEM SINAIS sugestivos de raiva	Animal NÃO PASSÍVEL DE OBSERVAÇÃO por 10 dias ou COM SINAIS sugestivos de raiva		
CONTATO INDIRETO: <ul style="list-style-type: none"> • Tocar ou alimentar animais; • Lambedura em pele íntegra; • Contato em pele íntegra com secreções ou excreções de animais raivosos ou de caso humano. 	LAVAR COM ÁGUA E SABÃO. NÃO INDICAR PROFILAXIA.			
LEVE: <ul style="list-style-type: none"> • Ferimento superficial no tronco ou membros, exceto mãos e pés; • Lambedura de lesões superficiais. 	LAVAR COM ÁGUA E SABÃO. NÃO INICIAR PROFILAXIA. Observar o animal por 10 dias. Permanecendo vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar VACINA nos dias 0, 3, 7 e 14.	LAVAR COM ÁGUA E SABÃO. INICIAR PROFILAXIA. VACINA nos dias 0, 3, 7 e 14.	Lavar com água e sabão INICIAR PROFILAXIA. VACINA* nos dias 0, 3, 7 e 14 e SORO (SAR ou IGHAR)*	
GRAVE: <ul style="list-style-type: none"> • Ferimento nas mucosas, cabeça e pescoço, nas mãos/pés; • Ferimentos múltiplos/extensos, em qualquer parte do corpo; • Ferimento profundo, mesmo que puntiforme; • Lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo intactas; • Ferimento por animal silvestre. 	Lavar com água e sabão NÃO INICIAR PROFILAXIA. Observar o animal por 10 dias. Permanecendo vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar VACINA* nos dias 0, 3, 7 e 14 e SORO (SAR ou IGHAR)*	Lavar com água e sabão. INICIAR PROFILAXIA. VACINA nos dias 0, 3, 7 e 14 e SORO (SAR ou IGHAR)		